


খরিফ চীনাবাদামের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ:দিনাজপুর,ঠাকুরগাঁও,পঞ্চগড়), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ:দিনাজপুর	খরিফ চীনাবাদাম										জীবনকালঃ ১২০-১৩০ দিন								
	মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র)		এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)				জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)			জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ)					
মাসসমূহ	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	
প্রমাসসপ্তাহ (Std. week)	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	২.০	৭.০	৮.০	৮.০	২৫.০	২৩.০	৩১.০	৩৬.০	৫৭.০	৫৫.০	৭৩.০	৫৭.০	৭৭.০	১১১.০	৯৬.০	১০৯.০	১০৫.০	৮১.০	
সর্বোচ্চতাপমাত্রা(°সে.)	৩২.০	৩২.১	৩৩.০	৩৩.৮	৩৩.০	৩২.৩	৩২.৩	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৮	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৩	৩২.৮	৩২.০	৩২.১	৩২.১	
সর্বনিম্নতাপমাত্রা(°সে.)	১৮.৬	১৯.৭	২০.৮	২১.১	২২.০	২২.০	২২.৩	২২.৯	২৩.৬	২৪.০	২৪.৮	২৫.০	২৫.১	২৫.৬	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	
গড় তাপমাত্রা(°সে.)	২৫.৩	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৩	২৭.৫	২৭.২	২৭.৩	২৭.৯	২৮.৩	২৮.৫	২৮.৯	২৯.২	২৯.১	২৯.০	২৯.২	২৯.০	২৯.১	২৯.১	
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৮৬.০	৮৭.১	৮৬.৬	৮৭.৮	৮৯.৮	৯১.১	৯২.৩	৯২.০	৯২.১	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.৮	৯৩.৯	৯৪.৭	৯৪.৮	৯৫.১	৯৪.৬	৯৪.৮	
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৩৬.৮	৪৩.৩	৪০.৯	৪৩.৮	৫০.৯	৫৩.৭	৫৭.৬	৫৭.৩	৫৯.৩	৬২.৮	৬২.৩	৬৫.৮	৬৭.৭	৭১.৮	৭১.৬	৭৩.৩	৭২.৭	৭১.৯	
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬১.২	৬৫.২	৬৩.৮	৬৫.৮	৭০.২	৭২.৮	৭৫.০	৭৪.৭	৭৫.৭	৭৭.৮	৭৭.৫	৭৯.৮	৮০.৮	৮৩.১	৮৩.০	৮৪.২	৮৩.৭	৮৩.২	
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৫.০	৪৯.০	৫২.০	৫৫.০	৪৯.০	৫০.০	৪৯.০	৫১.০	৪৮.০	৪৪.০	৪২.০	৪০.০	৩৫.০	২৭.০	৩১.০	২৭.০	২৯.০	৩১.০	
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	১৯২	১৭০	১৭১	১৫০	১৪২	১২৩	১১৮	১১৫	১১৯	১০৮	১১৭	১১১	১১৮	১২০	১২১	১২৭	১২১	১২৬	
বাতাসের গতি(কি.মি./ঘণ্টা)	৫.৬	৫.০	৫.৬	৪.৮	৪.৮	৫.৮	৩.৯	৩.৭	৪.৩	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৯	
ধাপসমূহ																			
	অংকুরোদগম	অঙ্গজ বৃদ্ধি				ফুল আসা				ফল আসা				পরিপক্বতা থেকে কর্তন					

অনুকূল আবহাওয়া					
তাপমাত্রা (°সে.)	>১৪° সেন্টিগ্রেড	২২-২৮° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৫০-৮৫%				
মাটির তাপমাত্রা(°সে.)	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড				
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৫০০-৭০০ মি.মি				
সূর্যালোক	পর্যাপ্ত সূর্যালোক		পর্যাপ্ত সূর্যালোক		পর্যাপ্ত সূর্যালোক
স্বাভাবিক ধাপভিত্তিক প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ (মি.মি.)	১৫০ মি.মি	১৫০-৪০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি

রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া					
পাতায় দাগ/টিক্রা রোগ	তাপমাত্রা ১৮-৩৫ ° সে., বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ৬০ মি.মি.				
রাষ্ট বা মরিচা রোগ	তাপমাত্রা ২০-২৬ ° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং সপ্তাহে ০৩ দিন বৃষ্টিপাত।				
গোড়া পঁচা /কান্ড পঁচা রোগ	তাপমাত্রা ২০-২৫° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং ভারি বৃষ্টিপাত।				
বান্ড নেক্রোসিস ভাইরাস	শুষ্ক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি. (পোষকের জন্য)				
বিছা পোকা	উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া।				
জ্যাসিড/পাতা শোষক পোকা	শুষ্ক এবং উষ্ণ আবহাওয়া (৩০-৩৮° সেন্টিগ্রেড)।				
উই পোকা	তাপমাত্রা ২৪-৩৪ ° সে., বেলে-দোআঁশ মাটি।				

আবহাওয়া সর্ভকবার্তা					
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	>১০০ মি.মি./দিন		>১০০ মি.মি./দিন		>৫০ মি.মি./দিন
ভেজা থাকার সময় কাল	১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.		১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.		১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া					মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া
খরা	১৫দিন		১৫দিন		
প্রবল বাতাস	২৮ কি.মি./ঘণ্টা		২২ কি.মি./ঘণ্টা		২৫ কি.মি./ঘণ্টা
শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি
তাপমাত্রা (°সে.)	সর্বোনিম্নতাপমাত্রা( <১৪° সে. এবং সর্বোচ্চতাপমাত্রা >৩৪° সে.				