

রবি চীনাবাদামের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহঃ যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ যশোর	রবি চীনাবাদাম												জীবনকালঃ ১৪০-১৫০ দিন								
	নভেম্বর(কার্তিক-অগ্রহায়ণ)				ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ-পৌষ)				জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ)				ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)			মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র)					
মাসসমূহ	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
প্রমাসসপ্তাহ (Std. week)	৮.০	৭.৫	১.০	২.০	১.৫	৪.০	০.০	৩.৫	০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৮.০	৭.৫	১.০	২.০	১.৫	৪.০	০.০	৩.৫	০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সে.)	৩১.১	৩০.৩	২৯.৬	২৮.৫	২৭.৭	২৬.৬	২৫.৭	২৫.২	২৪.৫	২৪.৫	২৫.১	২৫.৬	২৬.৬	২৭.৯	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা(°সে.)	১৯.৪	১৮.০	১৬.৭	১৫.১	১৪.০	১৩.৪	১২.৩	১১.৪	১০.৯	১০.৭	১১.০	১০.৮	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮
গড় তাপমাত্রা(°সে.)	২৫.৩	২৪.২	২৩.১	২১.৮	২০.৯	২০.০	১৯.০	১৮.৩	১৭.৭	১৭.৬	১৮.০	১৮.২	১৯.৩	২০.৫	২১.৮	২২.৮	২৩.৭	২৫.০	২৬.৩	২৭.৭	২৮.২
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.২	৯৫.৮	৯৫.৫	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৫২.০	৪৯.৮	৪৮.১	৪৬.৩	৪৭.২	৪৯.২	৪৯.৪	৪৭.৯	৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.০	৪৪.৭	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৭৪.০	৭২.৮	৭১.৯	৭০.৮	৭১.২	৭২.৫	৭২.৫	৭১.৮	৭২.৫	৭১.৬	৭১.২	৬৯.৮	৬৯.৫	৬৮.২	৬৭.৫	৬৬.৫	৬৪.৯	৬৩.৯	৬৩.৯	৬৪.৪	৬৭.২
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৮.৫	৪৯.৫	৪৭.৫	৪৮.৫	৪৭.৫	৪৩.৫	৪২.০	৪২.০	৪১.০	৪১.০	৪২.৫	৪৪.৫	৪৮.০	৪৭.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	১৭৫	১৭৭	১৭৯	১৭৮	১৮৪	১৮৩	১৭৭	১৭৪	১৫৮	১৫৬	১৮৮	১৯২	১৮৬	১৯১	২০৩	২১৪	২১৯	২১৩	২৩০	২১২	২০৮
বাতাসের গতি(কি.মি./ঘণ্টা)	২.৩	২.৪	২.৩	২.৪	২.৩	২.৪	২.৫	২.৫	৩.০	৩.০	৩.০	৩.০	৩.২	৩.১	৩.৩	৩.৭	৩.৫	৩.৯	৪.১	৪.৪	৪.৭
ধাপসমূহ																					
	অংকুরোদগম	অঙ্গজ বৃদ্ধি				ফুল আসা				ফল আসা				পরিপক্বতা থেকে কর্তন							

অনুকূল আবহাওয়া					
তাপমাত্রা (°সে.)	>১৪° সেন্টিগ্রেড	২২-২৮° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৫০-৮৫%				
মাটির তাপমাত্রা(°সে.)	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড				
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৫০০-৭০০ মি.মি				
সূর্যালোক	পর্যাপ্ত সূর্যালোক		পর্যাপ্ত সূর্যালোক		পর্যাপ্ত সূর্যালোক
স্বাভাবিক ধাপভিত্তিক প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ (মি.মি.)	১৫০ মি.মি	১৫০-৪০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি

রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া					
পাতায় দাগ/টিফা রোগ	তাপমাত্রা ১৮-৩৫° সে., বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ৬০ মি.মি.				
রাস্ট বা মরিচা রোগ	তাপমাত্রা ২০-২৬° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং সপ্তাহে ৩০ দিন বৃষ্টিপাত।				
গোড়া পঁচা/কান্ড পঁচা রোগ	তাপমাত্রা ২০-২৫° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং ভারি বৃষ্টিপাত।				
বান্ড নেক্রোসিস ভাইরাস	শুক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি. (পোষকের জন্য)				
বিছা পোকা	উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া।				
জ্যাসিড/পাতা শোষণ পোকা	শুক এবং উষ্ণ আবহাওয়া (৩০-৩৮° সেন্টিগ্রেড)।				
থ্রিপস	শুক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি.।				
উই পোকা	তাপমাত্রা ২৪-৩৪° সে., বেলে-দোআশ মাটি।				

আবহাওয়া সর্ভকবার্তা					
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	>১০০ মি.মি./দিন		>১০০ মি.মি./দিন		>৫০ মি.মি./দিন
ভেজা থাকার সময় কাল	১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.		১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.		১০দিনের জন্য >৩০মি.মি.
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া					মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া
খরা	১৫দিন		১৫দিন		১৫দিন
প্রবল বাতাস	২৮ কি.মি./ঘণ্টা		২২ কি.মি./ঘণ্টা		২৫ কি.মি./ঘণ্টা
শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি		শিলাবৃষ্টি
তাপমাত্রা (°সে.)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (<১৪° সে. এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা >৩৪° সে.)				