# তুলার সাদা মাছি পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

| | অঞ্চলঃ রাজশাহী | তুলা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আবহাওয়া সতর্কতা | মাস | জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ) | | | | আগষ্ট( শ্রাবণ-ভাদ্র) | | | | | সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ) | | | | অক্টোবর ( আশ্বিণ-কার্তিক) | | | | | নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ) | | | | ডিসেম্বর (অগ্রাহণ-পৌষ) | | | | |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে) | >৩৩° সে | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে) | >২৬° সে | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | > ৯৬ % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | > ৬৫ % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | >৪০ মি.মি. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া | **প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)** | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | ৫২ |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | ৬৬.০ | ৭১.০ | ৭৫.০ | ৭২.০ | ৫২.০ | ৫৭.০ | ৬৪.০ | ৫৩.০ | ৫৭.০ | ৫৪.০ | ৫৯.০ | ৫২.০ | ৮৩.০ | ৪৪.০ | ৩৫.০ | ২৩.০ | ১২.০ | ৭.০ | ৫.০ | ১.০ | ০.০ | ২.০ | ১.০ | ৩.০ | ০.০ | ৪.০ |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.) | ৩২.৭ | ৩২.৯ | ৩২.৩ | ৩২.৬ | ৩২.৯ | ৩২.৯ | ৩২.৭ | ৩৩.০ | ৩৩.০ | ৩২.৯ | ৩৩.০ | ৩৩.০ | ৩২.৯ | ৩২.৭ | ৩২.৩ | ৩১.৭ | ৩১.০ | ৩০.৪ | ৩০.৪ | ২৯.৬ | ২৮.৯ | ২৮.৩ | ২৭.০ | ২৬.০ | ২৫.৪ | ২৪.৪ |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.) | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.১ | ২৬.০ | ২৬.১ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৫.৩ | ২৫.০ | ২৪.১ | ২৩.১ | ২১.৪ | ২০.৭ | ১৯.৩ | ১৭.৬ | ১৬.৬ | ১৫.০ | ১৪.০ | ১৩.১ | ১২.৪ | ১১.৬ |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | ৯৬.৬ | ৯৬.৯ | ৯৭.০ | ৯৬.৯ | ৯৬.৭ | ৯৬.৬ | ৯৬.৭ | ৯৬.১ | ৯৬.৪ | ৯৬.৩ | ৯৬.৭ | ৯৬.৩ | ৯৬.৭ | ৯৬.৩ | ৯৬.৪ | ৯৬.১ | ৯৬.০ | ৯৫.৯ | ৯৬.১ | ৯৫.৭ | ৯৫.৩ | ৯৪.৭ | ৯৪.৭ | ৯৫.৯ | ৯৫.৩ | ৯৫.৭ |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | ৭৩.৭ | ৭৪.৩ | ৭৫.৩ | ৭৩.৯ | ৭২.৬ | ৭২.৬ | ৭৪.১ | ৭২.০ | ৭০.৯ | ৭১.৩ | ৭১.০ | ৬৯.৬ | ৬৮.৯ | ৬৭.৪ | ৬৪.৩ | ৬০.৯ | ৫৭.৪ | ৫৫.৯ | ৫১.৯ | ৪৯.৪ | ৪৭.৪ | ৪৫.৬ | ৪৬.৯ | ৫০.১ | ৫০.০ | ৫০.০ |
| | সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা) | ৫.৭ | ৬.১ | ৬.৩ | ৬.৭ | ৬.৩ | ৫.৬ | ৫.৭ | ৫.৬ | ৫.৬ | ৫.৬ | ৫.৬ | ৫.৬ | ৫.৪ | ৪.৮ | ৩.৯ | ৩.৯ | ৪.৩ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ | ৩.৭ |
| ধাপসমূহ | |  অংকুরোদগম ও চারা গজানো | | চারা সংস্থাপন | | | পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন | | | স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন | | | | | | | | বলের পরিপক্কতা ও তুলা সংগ্রহ | | | | | | | | |
| পোকার জীবন চক্র | | | | | | | | | | ডিম নিম্ফ পরিণত ডিম নিম্ফ পরিণত ডিম নিম্ফ পরিণত | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |