# আমের ফলের মাছি পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

| | অঞ্চলঃ রাজশাহী | আম | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | সময়কালঃ ১৬০-১৬৫দিন |
| আবহাওয়া সতর্কতা | মাস | জানুয়ারী( পৌষ-মাঘ) | | ফেব্রুয়ারী ( মাঘ-ফাল্গুন) | | | | | মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র) | | | | এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ) | | | | মে ( বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) | | | | জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়) | | | | | জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ) | |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে) | >৩৫° সে (১৩তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে) | < ২৪° সে (১৩তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | > ৯০ % (১৩তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | < ৫০ % (১৩তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | >১৫ মি.মি. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া | প্রমাণসপ্তাহ (Std. week) | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | ১.০ | ২.০ | ১.০ | ৪.০ | ৩.০ | ২.০ | ৩.০ | ৫.০ | ৪.০ | ৩.০ | ৪.০ | ১৪.০ | ১৩.০ | ১০.০ | ১৯.০ | ১৭.০ | ২৪.০ | ২৯.০ | ৩৩.০ | ৩৬.০ | ৩৪.০ | ৪৮.০ | ৫১.০ | ৭৮.০ | ৭২.০ |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.) | ২৩.৯ | ২৪.০ | ২৪.৯ | ২৫.৬ | ২৬.৭ | ২৮.১ | ২৯.৩ | ৩০.৪ | ৩২.১ | ৩৩.১ | ৩৪.৬ | ৩৫.০ | ৩৬.১ | ৩৬.৭ | ৩৬.৪ | ৩৫.৯ | ৩৫.৪ | ৩৫.৩ | ৩৫.১ | ৩৫.০ | ৩৫.৩ | ৩৫.০ | ৩৩.৯ | ৩৩.১ | ৩৩.০ |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.) | ১০.৯ | ১০.৯ | ১০.৯ | ১২.০ | ১২.৩ | ১৩.৬ | ১৪.১ | ১৫.১ | ১৬.৪ | ১৭.৬ | ১৯.৪ | ২০.৬ | ২২.১ | ২৩.০ | ২৩.৪ | ২৩.৯ | ২৩.৭ | ২৪.৩ | ২৪.৬ | ২৫.০ | ২৫.৪ | ২৫.৯ | ২৬.০ | ২৬.০ | ২৬.০ |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | ৯৫.১ | ৯৫.৩ | ৯৫.৩ | ৯৫.৩ | ৯৪.০ | ৯৩.৯ | ৯২.০ | ৯১.৬ | ৯০.৩ | ৮৮.৭ | ৮৮.৩ | ৮৯.১ | ৮৮.৯ | ৮৯.০ | ৯০.১ | ৯০.৭ | ৯২.১ | ৯২.৭ | ৯৩.৩ | ৯৩.১ | ৯৩.৭ | ৯৪.৬ | ৯৫.৪ | ৯৬.১ | ৯৬.৬ |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | ৪৮.৪ | ৪৭.৯ | ৪৫.৭ | ৪৪.৭ | ৪২.০ | ৪০.৩ | ৩৬.৬ | ৩৪.৬ | ৩২.৭ | ৩০.৪ | ৩০.৪ | ৩৫.৯ | ৩৪.৩ | ৩৪.৬ | ৪১.৪ | ৪৫.১ | ৫০.০ | ৫১.৯ | ৫৫.৬ | ৫৮.৩ | ৫৮.৯ | ৬২.৬ | ৬৭.৯ | ৭১.১ | ৭৩.৪ |
| | সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা) | ৪২.০ | ৪৬.০ | ৫২.০ | ৫১.০ | ৫৫.০ | ৫৬.০ | ৫৮.০ | ৫৯.০ | ৫৯.০ | ৫৯.০ | ৫৯.০ | ৫২.০ | ৫৭.০ | ৫৭.০ | ৫৭.০ | ৫৬.০ | ৫২.০ | ৫৩.০ | ৫৪.০ | ৪৮.০ | ৫১.০ | ৪৮.০ | ৩৫.০ | ৩১.০ | ৩১.০ |
| ধাপসমূহ | | শীর্ষকুড়ির স্ফীতি | | শীর্ষকুড়ির প্রসারণ | | | মঞ্জরীর বর্ধন ও ফুল আসা | | মটরদানা পর্যায় | | | | ফল বৃদ্ধি পর্যায় | | | | | | | ফল পরিপক্ক ও সংগ্রহ পর্যায় | | | | | |
| পোকার জীবন চক্র | | | | | | | | | | | | | ডিম | শুককীট | মূককীট | পরিণত | ডিম |  শুককীট | মূককীট | পরিণত | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |