



রবি মৌসুমে উৎপাদিত পেঁয়াজ ফসলের রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকা (পার্পল ব্লচ রোগ): যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		রবি মৌসুমের পেঁয়াজঃ (পার্পল ব্লচ রোগ)													সময়কাল : ১৪০-১৫০ দিন				
আবহাওয়া সর্ভকত	মাস	ফেব্রুয়ারি					মার্চ				এপ্রিল				মে				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	উষ্ণ তাপমাত্রা, ৩০°সেঃ																	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১°সেঃ																	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	উচ্চ আর্দ্রতা ৯০% বা তার বেশি (ভিজা এবং আর্দ্র অবস্থা)																	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮০%																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ের মাঝারি থেকে ঘন ঘন ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভারী শিশির এর কারণে পাতা দীর্ঘসময় (১২ ঘন্টা বা এর বেশি) ভেজা থাকলে রোগ বিস্তার ঘটে।																	
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০
	সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৪৮.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫
	ধাপ সমূহ																		
		অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ					উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি				বাল্ব গঠন				ফসল কাটা				
রোগের জীবন চক্র																			
		পোষক এর সাথে স্পোরের সংযুক্তি		স্পোর অঙ্কুরোদগম		জীবাণু টিউব গঠন এবং অনুপ্রবেশ		রোগের বিস্তার		রোগ সংক্রমণ হওয়ার পর রোগ চক্র ফসলের বাল্ব গঠন এবং বিকাশ পর্যায় পর্যন্ত চলমান থাকে।									