


রবি মৌসুমের মরিচ ফসলের রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকা (পাতা কোঁকড়ানো রোগ): সিলেট অঞ্চল (জেলা: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ), বাংলাদেশ

অঞ্চল : সিলেট		রবি মৌসুমের মরিচঃ (পাতা কোঁকড়ানো রোগ)								সময়কাল : ১৫০-১৬০ দিন												
আবহাওয়া সর্তকতা	মাস	ডিসেম্বর				জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	বাহক (সাদা মাছি) এর সংখ্যা এবং ভাইরাস বিস্তার বৃদ্ধি পায় ৩৫°সেঃ তাপমাত্রায়																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	বাহক (সাদা মাছি) এর সংখ্যা এবং ভাইরাস বিস্তার প্রভাবিত হয় ১৫°সেঃ তাপমাত্রার উপরে																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	নির্দিষ্ট ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক আদ্রতার রোগ বিস্তারের অনুকূল																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	রোগ বিস্তার আপেক্ষিক আদ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত যেমন-আপেক্ষিক আদ্রতা কম হলে রোগের বিস্তার কম হবে																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাত রোগ বিস্তারের অনুকূল																				
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.৫	৪.৫	১.০	৪.০	০.০	০.৫	০.৫	১.০	২.৫	৪.০	৮.০	১১.৫	১১.০	১০.৫	১৭.৫	৩৪.০	৪৮.৫	৬৫.৫	৫৯.০	৭৮.৫	৮৫.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৭.৮	২৬.৯	২৬.১	২৫.৭	২৫.৩	২৪.৭	২৫.১	২৫.৮	২৬.৫	২৭.২	২৮.২	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩১.৬	৩২.১	৩১.৮	৩২.১	৩২.৫	৩২.০	৩১.৭
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৪.৩	১৩.৭	১২.৬	১২.০	১১.৪	১১.৩	১১.৩	১১.১	১২.১	১২.৬	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৪	১৬.৭	১৮.০	১৯.২	২০.০	২০.৮	২১.৪	২১.৮	২১.৮
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৭	৯৫.৭	৯৫.৩	৯৬.১	৯৫.৮	৯৬.১	৯৫.৫	৯৪.৯	৯৪.৩	৯২.৯	৯২.৮	৯২.৫	৯১.৭	৯০.৯	৯০.৭	৯০.২	৯১.৭	৯২.৩	৯২.২	৯৩.১	৯৩.২
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫১.৪	৫৩.৬	৫৩.০	৫২.৭	৫৩.৫	৫৩.৯	৫০.৭	৪৮.১	৪৫.৮	৪২.৩	৪২.৫	৪১.৭	৪০.৮	৪১.১	৪১.০	৪৫.০	৫০.৯	৫৩.৫	৫৪.৭	৫৮.২	৫৯.৭
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৫.৫	৫০.৫	৫১.৫	৫০.৫	৫১.০	৪৫.০	৪৮.০	৫১.০	৫০.৫	৫৫.০	৫৩.৫	৫৫.৫	৫৬.০	৫৫.০	৫৬.০	৫১.০	৪৭.০	৫০.৫	৫১.০	৪৮.৫	৪৬.৫
ধাপ সমূহ																						
		অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি				ফুল এবং ফল				ফসল কাটা								
রোগের জীবন চক্র																						
	হোস্ট কোষে ভাইরাস সংযুক্তি	অনুপ্রবেশ, প্রতিলিপি এবং মুক্ত করা	সংক্রমণ	রোগ বিস্তার	হোস্ট কোষে ভাইরাস সংযুক্তি থেকে রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া পরিপক্বতা পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।																	

		অঞ্চল : সিলেট				খরিফ মৌসুমের মরিচঃ (পাতা কোঁকড়ানো রোগ)				সময়কাল : ১৫০-১৬০ দিন															
আবহাওয়া সর্বকর্তা		মাস		এপ্রিল				মে				জুন				জুলাই				আগস্ট					
		সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)		বাহক (সাদা মাছি) এর সংখ্যা এবং ভাইরাস বিস্তার বৃদ্ধি পায় ৩৫°সেঃ তাপমাত্রায়																					
		সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)		বাহক (সাদা মাছি) এর সংখ্যা এবং ভাইরাস বিস্তার প্রভাবিত হয় ১৫°সেঃ তাপমাত্রার উপরে																					
		সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)		নির্দিষ্ট ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক আদ্রতার রোগ বিস্তারের অনুকূল																					
		সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)		রোগ বিস্তার আপেক্ষিক আদ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত যেমন-আপেক্ষিক আদ্রতা কম হলে রোগের বিস্তার কম হবে																					
		বৃষ্টিপাত (মিমি)		বৃষ্টিপাত রোগ বিস্তারের অনুকূল																					
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া		প্রধানসম্প্রদায়		১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
		বৃষ্টিপাত (মিমি)		৬৫.৫	৫৯.০	৭৮.৫	৮৫.৫	১০২.৫	১০৭.৫	১২২.০	১১৬.৫	১৪৮.৫	১৫২.০	১৬৮.০	১২৯.৫	১৩৭.৫	১৩০.০	১১০.০	১২৯.৫	১২৯.০	১২৩.৫	১০৩.০	১১৮.৫	১০৫.০	৯৬.০
		সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)		৩২.১	৩২.৫	৩২.০	৩১.৭	৩১.৫	৩১.৬	৩১.৯	৩২.২	৩১.৫	৩১.৯	৩১.৬	৩১.৯	৩১.৭	৩২.০	৩১.৮	৩২.২	৩২.৩	৩২.৮	৩২.২	৩২.২	৩২.২	৩২.৫
		সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)		২০.৮	২১.৪	২১.৮	২১.৮	২২.০	২২.৭	২৩.২	২৩.৬	২৪.০	২৪.৪	২৪.৯	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.২	২৫.০	২৫.০	২৫.১	২৫.৩	২৫.২	২৫.০	২৫.০
		সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)		৯২.৩	৯২.২	৯৩.১	৯৩.২	৯৪.০	৯৪.৬	৯৪.৭	৯৪.৯	৯৫.২	৯৫.৮	৯৬.০	৯৬.২	৯৬.০	৯৫.৯	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.৩	৯৬.৩
		সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)		৫৩.৫	৫৪.৭	৫৮.২	৫৯.৭	৬৩.১	৬৪.২	৬৫.৬	৬৭.২	৭০.৬	৭১.৮	৭৩.৬	৭৩.৭	৭৪.০	৭৩.৯	৭৩.৪	৭৪.২	৭২.৬	৭২.৪	৭০.৯	৭২.৮	৭৩.০	৭২.৪
		সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)		৫০.৫	৫১.০	৪৮.৫	৪৬.৫	৪৫.০	৪৩.৫	৪৩.৫	৩৮.৫	৩৩.৫	৩১.৫	২৬.০	২৭.৫	২৩.৫	২৫.০	২৭.০	২৬.০	৩০	৩৩.০	৩৩.৫	২৯.৫	৩২.৫	৩৩.৫
ধাপ সমূহ																									
		অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি				ফুল এবং ফল				ফসল কাটা											
রোগের জীবন চক্র																									
		হোস্ট কোষে ভাইরাস সংযুক্তি	অনুপ্রবেশ, প্রতিলিপি এবং মুক্ত করা		সংক্রমণ		রোগ বিস্তার		হোস্ট কোষে ভাইরাস সংযুক্তি থেকে রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া পরিপক্বতা পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।																