



খরিফ রবি ফসলের আবহাওয়া ক্যালেন্ডার শসা (মোজাইক ভাইরাস রোগ) : কুমিল্লা অঞ্চল (জেলা: কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) বাংলাদেশ

অঞ্চল : কুমিল্লা		খরিফ রবি মৌসুম : মরিচ (ফল বোরর পোকা)										সময়কাল : ১০০-১২০ দিন												
আবহাওয়া সত্যকতা	মাস	ফেব্রুয়ারি					মার্চ					এপ্রিল			মে									
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২°সেঃ																						
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬°সেঃ																						
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	নির্দিষ্ট ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে রোগের বিকাশ ঘটতে পারে																						
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	রোগের বিকাশ আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ আর্দ্রতা কমে যাওয়ায় রোগের ঘটনা হ্রাস পায়																						
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	রোগের বিকাশ বৃষ্টিপাতের অনুকূলে																						
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসত্তাহ	৫	৬	৭			৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		১৮	১৯	২০	২১	২২		
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩.০	৩.০	৬.০			৭.৫	৮.৫	৭.০	৯.০	১৯.০	২৭.০	২৫.৫	২৩.০	৩৩.০	৪২.০	৫৪.৫		৬৩.৫	৬৬.০	৭১.০	৮০.০		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৬.২	২৭.৩	২৮.১			২৯.১	২৯.৮	৩০.৯	৩২.০	৩২.২	৩২.৫	৩২.৫	৩৩.০	৩৩.২	৩৩.১	৩২.৯		৩৩.২	৩৩.২	৩৩.৯	৩৩.১		
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৪.২	১৪.৫	১৬.২			১৬.৭	১৮.১	১৯.২	১৯.৯	২১.৫	২২.০	২৩.১	২৩.৫	২৩.৭	২৩.৫	২৩.৭		২৪.৩	২৪.৭	২৫.২	২৫.৬		
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৬	৯৪.৪	৯৩.৯			৯৪.১	৯৩.৯	৯৩.৯	৯৩.৫	৯৩.৭	৯৪.০	৯৪.১	৯৩.৮	৯৩.৯	৯৪.১	৯৪.২		৯৪.০	৯৪.৫	৯৪.৩	৯৪.৬		
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৭.৭	৪৫.২	৪৬.৮			৪৬.১	৪৬.৮	৪৭.৪	৪৭.৭	৫২.৬	৫৫.৯	৫৮.৭	৫৯.৬	৬০.৯	৬১.৭	৬৩.০		৬৩.৫	৬৪.৮	৬৬.৭	৬৯.০		
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৭.০	৫০.০	৪৯.৫			৫০.৫	৫২.৫	৫২.৫	৫২.৫	৫১.০	৪৮.৫	৫১.০	৫২.০	৫২.৫	৫১.০	৪৭.৫		৪৭.৫	৪৬.৫	৪১.০	৩৮.০		
ধাপ সমূহ																								
																								
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ						উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি						ফুল এবং ফল						ফসল কাটা					
জীবন চক্র																								
	হোস্ট কোষে ভাইরাস সংযুক্তি	অনুপ্রবেশ, প্রতিলিপি এবং প্রকাশ	সংক্রমণ	রোগের বিকাশ	রোগের বিকাশ প্রক্রিয়ার সাথে হোস্ট কোষে ভাইরাস সংযুক্তি পরিপক্বতার পর্যায় পর্যাপ্ত অব্যাহত থাকে																			

