

রবি মৌসুমের পোকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা মিষ্টি কুমড়া (লাল কুমড়া পোকা): চট্টগ্রাম অঞ্চল (জেলা: চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, নেয়াখালী ও ফেনী), বাংলাদেশ

অঞ্চল : চট্টগ্রাম		রবি মৌসুম মিষ্ঠি কুমড়া : (লাল কুমড়া পোকা)												সময়কাল : ১১০-১২০ দিন													
জনপ্রিয় কুমড়া পোকা বৃষ্টিপাতা অনুভূতি অনুভূতি	মাস	সেপ্টেম্বর						অক্টোবর				নভেম্বর				ডিসেম্বর											
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম্ব অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)												১৫°সেঃ বা তার নিচে													
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আদ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক												আপেক্ষিক আদ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম													
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	আপেক্ষিক আদ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম												লাল কুমড়া পোকা প্রাচুর্যের সাথে নেতৃত্বাত্মক সম্পর্ক													
	বৃষ্টিপাতা (মিমি)																										
	প্রমাণসংহত	৩৬	৩৭	৩৮			৩৯			৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২					
মাস অনুভূতি অনুভূতি অনুভূতি অনুভূতি অনুভূতি অনুভূতি অনুভূতি অনুভূতি	বৃষ্টিপাতা (মিমি)	১১৮.৩	৯২.৭	৭৩.৩			৭৩.৭			৬০.৩	৬৬.৭	৭৫.৭	২৬.০	১৯.৩	২১.৭	১৪.৩	৯.০	১১.৭	১.০	৮.০	২.৩	২.০					
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.৩	৩১.৮	৩১.৯			৩১.৯			৩২.১	৩২.২	৩১.৯	৩১.৯	৩১.৫	৩১.২	৩০.৫	২৯.৯	২৯.০	২৮.৬	২৭.৮	২৬.৯	২৬.৬					
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৫.৩	২৫.২	২৫.১			২৫.২			২৫.১	২৫.০	২৪.৮	২৩.৩	২২.৮	২১.৬	২০.২	১৯.২	১৮.০	১৭.০	১৬.৩	১৫.৩	১৪.৯					
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.৯	৯৫.৬	৯৫.৭			৯৫.৭			৯৫.৭	৯৬.০	৯৬.১	৯৫.০	৯৪.৯	৯৪.৭	৯৪.৮	৯৪.১	৯৪.৫	৯৪.৮	৯৪.২	৯৪.৮	৯৪.১					
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৪.২	৭৩.৮	৭২.২			৭১.৫			৭০.২	৬৯.৯	৬৮.৮	৬২.২	৬২.২	৫৮.১	৫৫.৮	৫২.০	৫০.৮	৪৯.৫	৫০.০	৫০.৩	৪৯.১					
	সূর্যোলক ঘটনা (ঘটনা)	৩৬.৮	৩৫.৮	৩৯.৩			৩৯.৫			৪২.৫	৪২.৮	৪৫.৮	৫৩.৩	৫২.৩	৫৪.০	৫৫.৫	৫৬.৫	৫৫.৫	৫৪.৮	৫২.৮	৫০.৮	৫১.৩					
	ধাপ সমূহ																										
ধাপ সমূহ		অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ						অঙ্গ বৃদ্ধি						ফুল ও ফল						ফসল কাটা							
পোকার জীবন চক্র																											
				ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)	লার্ভা (১৩ থেকে ২৫ দিন)	পিটপা (৭ থেকে ২০ দিন)		প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)						প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)													

খরিফ মৌসুমের পোকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা মিষ্টি কুমড়া (লাল কুমড়া পোকা)ঃ চট্টগ্রাম অঞ্চল (জেলা: চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, নোয়াখালী ও ফেনী), বাংলাদেশ

অঞ্চল ঃ চট্টগ্রাম		খরিফ মৌসুম মিষ্টি কুমড়া ঃ (লাল কুমড়া পোকা)												সময়কাল : ১২০-১৫০ দিন										
চট্টগ্রাম অঞ্চল	মাস	এপ্রিল						মে			জুন			জুলাই										
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম্ব অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																						
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																						
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আদ্রতার অভ্যর্থনা সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক																						
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	আপেক্ষিক আদ্রতার গঠনামূলক বিপৃত্ত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																						
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা প্রাচুর্যের সাথে নেতৃত্বাচক সম্পর্ক																						
চট্টগ্রাম অঞ্চল	প্রমাণসংগ্রহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০						
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	২১.৩	২৭.০	৩৪.৩	৩৬.০	৬২.৭	৬১.৩	৭০.৩	৮৮.৭	৮৮.০	১১৯.৩	১৬১.০	১৮০.৭	১৯৭.৩	২০১.৭	১৫৬.০	১৮৯.০	১৭৩.৩						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.১	৩২.৬	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৮	৩২.৯	৩২.৮	৩২.৫	৩২.৩	৩২.১	৩১.৫	৩১.৩	৩০.৯	৩০.৭	৩১.১	৩০.৭	৩০.৯						
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৩.৫	২৪.০	২৪.৮	২৪.৫	২৪.৫	২৪.৮	২৫.২	২৫.২	২৫.৬	২৫.৬	২৫.৮	২৫.৮	২৫.২	২৫.৮	২৫.৩	২৫.২	২৫.৩						
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৩.৩	৯২.৯	৯২.৬	৯২.৮	৯২.৯	৯৩.৩	৯৩.৫	৯৩.৯	৯৪.০	৯৪.৯	৯৫.৩	৯৫.১	৯৫.৯	৯৬.০	৯৫.৭	৯৬.১	৯৫.৮						
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬০.১	৬০.৫	৬১.৬	৬২.০	৬২.৩	৬৪.১	৬৬.১	৬৮.৯	৭০.২	৭১.৯	৭৮.৮	৭৫.৩	৭৭.৩	৭৭.৭	৭৬.৮	৭৭.৬	৭৬.৩						
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৬.০	৫৬.০	৫৮.৮	৫৫.৩	৫২.৮	৫৫.০	৪৮.০	৪২.৮	৪০.৩	৩৬.৮	২৮.০	২৮.০	২৫.৩	২৪.০	২৯.০	২৫.৫	৩০.০						
ধাপ সমূহ																								
		অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ						অঙ্গ বৃদ্ধি						ফুল ও ফল										
পোকার জীবন চক্র																								
		ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)						লার্ভা (১৩ থেকে ২৫ দিন)						পিউপা (৭ থেকে ২০ দিন)										
		প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)						প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)																